

Памятка для населения «Алгоритм действий при присасывании клеща»

I. При присасывании клеща необходимо как можно раньше (в первые 1 – 2 суток) обратиться в медицинскую организацию для:

- получения медицинской помощи по удалению клеща;
- проведения необходимых лабораторных исследований (клещ, кровь);
- назначения экстренной профилактики клещевых инфекций по результатам исследований.

Медицинская помощь по поводу присасывания клеща, в том числе исследование клещей (живых, неповреждённых) на наличие антигена вируса КВЭ оказывается бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

II. Если у вас сразу после укуса нет возможности обратиться в медицинскую организацию, то следует **присосавшегося клеща удалить самостоятельно как можно быстрее**. Можно удалить клеща при помощи нитки, завязав узелок вокруг впившейся части клеща. Осторожно, потягивая концы нити вверх и в стороны, вытянуть его. Ранку обязательно смажьте раствором йода, спирта и т.п.

Ни в коем случае нельзя раздавливать клеща, т.к. можно втереть возбудителя в кожу и заразиться клещевым энцефалитом. Если нет возможности доставить клеща на исследование, его лучше сжечь.

Присосавшегося клеща, в случае возможности его исследования, следует сохранить в плотно закрытом флаконе (предварительно положив влажный кусочек ваты или свежую травинку) с целью определения заражённости клещевыми инфекциями. В ближайшее время необходимо обратиться в медицинскую организацию к врачу-инфекционисту или участковому терапевту, педиатру для получения медицинской консультации о проведении лабораторных исследований и профилактики инфекций, передаваемых при укусе клещом.

III. После укуса клещом в течение месяца необходимо наблюдать за состоянием здоровья и при повышении температуры или появлении головной боли, слабости немедленно обратиться к врачу, сообщив о факте присасывания клеща.